



Appendix 1. Timeline of present history

Gaze position	Score if always	Score if sometimes	Score if never	Score
Straight ahead in distance	6	3	0	
Up	2	1	0	
Down	4	2	0	
Right	4	2	0	
Left	4	2	0	
Reading	4	2	0	
Any position	1	1	0	
Total				

Appendix 2. Diplopia questionnaire

Q1. 입원 이전까지의 검사 및 치료 과정과 예후 설명은 어떠하였습니까?

A1. 안과적 검사 외에 특별한 치료 과정은 없었다. 한쪽 눈가림, 프리즘 안경 등의 치료법은 복시 정도와 손상이 심하여 해당되지 않는다고 들었다. 그나마 정상적으로 보이는 시야 범위도 추후 초점이 맞지 않을 수 있으며 경과를 살펴본 뒤에 추가 수술을 고려해야 한다고 하였다.

Q2. 입원 이전까지의 일상생활 및 사회생활에서의 불편함은 어떤 것들이 있었으며, 신체 및 감정 상태는 어떠하였습니까?

A2. 복시로 인해 대부분의 일상생활에 지장이 있었다. 운전은 엄두도 내지 못했으며 식사하거나 계단 혹은 도로에서의 도보에서 매우 불편함을 느꼈다. 이로 인한 스트레스가 심하여 탈모 증상까지 나타났으며, 사람을 기피하고 술에 의존하는 경우가 많았다.

Q3. 입원 기간 동안 받은 한방치료에 대한 느낌과 치료 종료 후의 신체 및 감정 상태는 어떻습니까?

A3. 전침치료의 경우 치료 직후에는 1~2시간 정도 안구 주변이 얼얼하면서 일시적으로 복시가 오히려 심해지는 듯한 느낌도 들었으나, 매주 호전되는 변화가 느껴져 치료에 대한 희망이 생겼다. 자연스럽게 정면 방향의 사물을 볼 때 복시가 없어졌으며 각종 일상생활이 불편함 없이 가능하게 되었다. 대인기피 경향도 줄었고 생각이 밝은 느낌이다.

Q4. 입원 기간 동안의 한방치료에 대한 만족도가 어떻습니까?

1-매우 불만족, 2-불만족, 3-보통, 4-만족, 5-매우 만족

A4. 5점, 매우 만족한다.

Q5. 퇴원 이후 일상생활로의 복귀에 대한 기대감은 어떻습니까?

1-매우 부정적, 2-부정적, 3-보통, 4-긍정적, 5-매우 긍정적

A5. 5점, 매우 긍정적이다.

Appendix 3. Records of interview